

FLOR-STOP® DC

Borvirágosodás elleni úszótabletta

Ez a borászati piacon a legismertebb, a Dal Cin által 1958-ban kifejlesztett és szabadalmaztatott specialitás. Hatalmas gyakorlati jelentőségű termék, és még ma is a leghatékonyabb és legegyszerűbb eszköz a borvirágosodás és ecetesedés fellépése ellen. A FLOR-STOP® tisztított paraffin korongokból áll, melyek kis mennyiségben allil-izotiocianátot tartalmaznak az 1999.05.17-i 1493/1999/EK rendelet IV cikkely 3. bekezdés u. pontjának megfelelően; ilyen aktivált formában a bor felszínén lebegve megvédik felületét minden aerob típusú elváltozástól. Az úszó tabletták használata különösen előnyös a borok demizsonokban (az egyes területeken hagyományosan használt olaj rátöltése törvénybe ütközik), hordókban, barrique-okban, tartályokban és általában bármilyen zárt edényben való tárolásakor. Ennek érdekében a FLOR-STOP® -ot háromféle kiserelésben forgalmazzuk: kicsi (1 g) kannákhoz, demizsonokhoz, közepes (7 g) hordókhoz és nagy (20 g) tartályokhoz. Ha az edények esetleg nyitva vannak, vagy nincsenek egészen tele, az úszótabletták hatása akkor is hosszú idejű; ezen kívül nem bocsátanak ki semmilyen idegen ízt, vagy szagot a borba. Fontos ezen kívül hangsúlyozni, milyen könnyű és egyszerű az úszótabletták alkalmazása, adagolásuk kényelmes, használatuk rendkívül gazdaságos.

Összetétel

Tiszta paraffinból készült úszótabletták, melyek változó százalékban tartalmaznak allil-izotiocianátot az alkalmazott mérettől függően: 0.5% (legalább 20 literes demizsonokhoz), 1.7% (barrique-okhoz és 2 - 20 hl-es hordókhoz), 2.0% (50 hl -es és nagyobb tartályokhoz).

Adagolás és a felhasználás módja

Elegendő egyetlen úszótablettát edényenként (demizson, barrique, vagy tartály), a megvédeni kívánt bor felszínére helyezni; ha elhasználódott ki kell cserélni: általában az úszótabletták néhány héttől két-három hónapig terjedő ideig aktívak, a vendő bor szabad felületének nagyságától, a külső hőmérséklettől, az edények nyitási gyakoriságától és a már esetleg jelenlévő szennyeződésektől függően. A tablettát elhasználódottnak tekinthetjük, ha jellegzetes szúrós szaga már nem érezhető.

Óvatossági szabályok a felhasználás során

Az edényeket ajánlatos megfelelő rendszerességgel feltölteni, hogy ne maradjon túl nagy légtér a bor felületével érintkezésben, ezen kívül ellenőrizni kell a boros edények és tartályok zárásának tökéletes tömítettségét. A nyári időszakban, illetve magas környezeti hőmérséklet esetén nyilvánvalóan nagyobb figyelmet kell erre fordítani.

Tárolás

A FLOR-STOP® úszótabletták alacsony hőmérsékleten több hónapon át eltarthatók, lehetőleg hűtőszekrényben (5°C) vagy akár mélyhűtőben. A tabletták esetleges elszíneződése (általában fehér vagy sárgás) nem befolyásolja a hatásosságukat. A nem teljesen felhasznált csomagolásokat fontos gondosan visszazárni.

Csomagolás

25 db, 12 db-os tasak zsákban, demizsonokhoz (összesen 300 db).; 40 db, 2 db-os tasak zsákban, hordókhoz (összesen 80 db); 40 db, 1 db-os tasak zsákban, tartályokhoz (összesen 40 db)

